УДК 549: 553. 31 (477.63)

В. Стрельцов, асп.
E-mail: mister.strelcov@bk.ru,В. Євтєхов, д-р геол. наук, проф.
E-mail: evtekhov@gmail.com,А. Євтєхова, канд. геол. наук, доц.
E-mail: eva_anna@mail.ru,
Криворізький національний університет
вул. Пушкіна, 37, м. Кривий Ріг, 50002, Україна

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МІНЕРАЛОГІЧНОЇ ЗОНАЛЬНОСТІ ЗАЛІЗОРУДНИХ РИБЕКІТОВИХ МЕТАСОМАТИТІВ КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мін. наук, проф. В.М. Загнітком)

Натрієвий метасоматоз відноситься до епігенетичних геологічних процесів, які мали суттєвий вплив на мінералогічні показники та збагачуваність метаморфогенних бідних магнетитових руд (магнетитових кварцитів). Він спричинив утворення егіринових та рибекітових метасоматитів у продуктивних товщах шести з дев'яти залізрудних родовищ, що розробляють чотири гірничозбагачувальні комбінати Криворізького басейну. Рибекітові метасоматити формувались при відносно низьких термодинамічних показниках середовища мінералоутворення, тому мають значно більше поширення в порівнянні з егіриновими, відповідно, 90 та 10% від загального об'єму тіл метасоматично змінених руд.

Тіла рибекітових метасоматитів, що були об'єктом дослідження авторів, мають максимальну потужність за умови їх утворення у верствах безсилікатних залізностлюдо-магнетитових (до 100 м, середній показник – 56 м) та магнетитових (до 70 м, в середньому 47 м) кварцитів, які складають центральні частини залізистих горизонтів саксаганської світи. За рахунок кумінгтоніт-магнетитових та магнетит-кумінгтонітових кварцитів з периферійних зон горизонтів утворювались тіла рибекітових (магнезіорибекітових) метасоматитів значно меншої потужності, відповідно, до 30 та до 15 м (в середньому 19 і 8 м).

Незважаючи на мінеральний склад вихідних магнетитових кварцитів, тіла рибекітових метасоматитів характеризуються аналогічною внутрішньою будовою. Тілова зона, яка безпосередньо прилягає до підвідного каналу метасоматизуючих розчинів, представлена магнетит-рибекітовими метасоматитами. Проміжну зону складають різною мірою рибекітизовані першинні магнетитові кварцити. Передова зона, яку представляють вторинно окварцовані магнетитові кварцити, формувалась внаслідок "відгонки" відпрацьованих метасоматизуючих розчинів, насичених кремнеземом. Для передової зони характерні поступові переходи до незмінених магнетитових кварцитів.

Головним трендом мінералогічних змін магнетитових кварцитів у зв'язку з натрієвим метасоматозом було наближення їх складу до практично бімінерального – магнетит + рибекіт (магнезіорибекіт). Рибекіт, близький за складом до стехіометричного, характерний для метасоматитів, які утворились по залізностлюдо-магнетитових та магнетитових кварцитах. При рибекітизації кумінгтоніт-магнетитових і магнетит-кумінгтонітових кварцитів відбувалось, переважно, псевдоморфне заміщення кумінгтоніту натрієвим амфіболом, склад якого відповідає магнезіорибекіту.

Результати мінералогічного дослідження рибекітових метасоматитів є основою для вдосконалення методів геологічного, мінералогічного, технологічного картування рудних покладів, корегування мінералого-технологічних класифікацій руд, оптимізації методів усереднення руд перед подачею на збагачувальні фабрики.

Ключові слова: залізисто-кремниста формація, Криворізький басейн, натрієві метасоматити, мінералогія.

Постановка проблеми. Початок ХХІ століття характеризується проявом спадів промислового виробництва і, як наслідок, зменшенням потреб у залізрудній сировині. З останнім тісно пов'язане зростання вимог металургійних підприємств до якості залізрудного концентрату, аглоконцентрату, агломераційної руди. По відношенню до залізрудного концентрату це означає підвищення вмісту в його складі заліза з 64-66 до 68-69 мас.%. Досягнення цього неможливе без переоцінки залізних руд, уточнення їх мінералогічних і технологічних класифікацій, оптимізації за даними детальних мінералогічних досліджень технологій видобутку руд, усереднення рудного матеріалу перед подачею на збагачувальні фабрики, способів рудопідготовки та виробництва концентрату [2, 7, 10].

До головних чинників, які ускладнюють вирішення задачі підвищення показників збагачення залізних руд, відноситься їх неоднорідність за мінеральним, хімічним складом, структурою, текстурою. Ця варіативність спричинена проявом геологічних процесів, в ході яких утворились рудні поклади: 1) седиментація (спричинила неоднорідність складу вихідних залізисто-кремнистих осадків); 2) метаморфізм (викликав різний ступінь перекристалізації осадового матеріалу в різних термодинамічних умовах динамотермального метаморфізму); 3) тектонічні процеси (обумовили неоднорідність перекристалізації руд у зв'язку з плікативними та дезінтеграції в зв'язку з диз'юнктивними порушеннями); 4) метасоматоз (викликав локальний прояв дії вуглекисло-натрієвих гідротермальних розчинів на руди); 5) гіпергенез (спричинив різний ступінь вивітрювання залізних руд).

Натрієвого метасоматозу зазнали породи залізисто-кремнистої формації Криворізького басейну, метаморфізовані в умовах різних фацій динамотермального метаморфізму. Найбільш активно метасоматоз проявлений у межах Первомайського, Ганнівського, Валявкинського, Інгuleцького, Петрівського, Артемівського родовищ, залізисті породи яких метаморфізовані в умовах епідот-амфіболітової фації. Магнетитові кварцити, які складають залізисті горизонти цих родовищ, зазнали впливу вуглекисло-натрієвих розчинів, температура яких коливалась у межах 300-500^оС, флюїдний тиск складав 150-300 МПа і які характеризувались високою активністю натрію та фугитивністю кисню. В результаті магнетитові кварцити перетворились на рибекіт-магнетит-егіринові метасоматити (егіриніти), магнетит-рибекітові метасоматити (рибекітити), рибекіт-магнетитові, залізностлюдо-рибекіт-магнетитові кварцити [3, 4, 8]. У сланцевих горизонтах, прилеглих до зон активного натрієвого метасоматозу залізистих кварцитів, за рахунок біотит-кварц-мусковітових сланців формувались тіла кварц-хлорит-альбітових метасоматитів (альбітитів) [4].

Утворення егіринітів відбувалось за умов найбільш високих термодинамічних показників розчинів, тому їх поширення є відносно невисоким у порівнянні з поширенням рибекітових метасоматитів. За даними підрахунків авторів цієї статті, виконаних для продуктивних товщ Первомайського, Ганнівського, Петрівського, Артемівського Інгuleцького, Валявкинського родовищ, які розробляються Північним, Центральним, Інгuleцьким та Новокириворізьким гірничозбагачувальними комбінатами, кількість егіринових метасоматитів становить 10,3% від загального об'єму покладів метасоматично

змінених магнетитових кварцитів; кількість рибекітових метасоматитів, відповідно, – 89,7%. Альбітити в межах досліджених родовищ зустрічаються досить рідко; через відсутність у їх складі магнетиту вони не розглядаються як залізорудна сировина. В зв'язку з максимальним проявом – саме рибекітизація розглядається як метасоматичний процес, що найбільшою мірою вплинув на мінералогічні властивості та, як наслідок, на технологічні показники магнетитових кварцитів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Рибекітові метасоматити відносяться до найбільш глибоко вивчених геологічних утворень залізисто-кремнистої формації Кривбасу. Попередні дослідники зосереджувались на питаннях природи метасоматизуючих розчинів, локалізації метасоматичних тіл, неоднорідності їх будови, варіативності мінерального та хімічного складу, металогенії [1-6, 8-10]. Пік активності цих досліджень припадає на 60-80 рр. XX ст. Протягом останніх 30 років натрієві, в тому числі рибекітові метасоматити привертати до себе значно менше уваги. В той же час, у цей період максимального розвитку набув видобуток натрієвих метасоматитів як залізорудної сировини. Постає потреба виконання досліджень їх прикладної мінералогії, в тому числі спрямованих на підвищення ефективності геологічного, мінералогічного та технологічного картування залізорудних покладів. Стосовно натрієвих метасоматитів важливим у цьому відношенні аспектом є вивчення мінералогічної зональності їх тіл. Вона досить детально була описана для різновидів тіл, які характеризуються присутністю тилової зони егіринітів [3-6, 8]. Але гірничодобувні роботи останніх років показали, що натрієві метасоматити такого складу, як зазначено вище, зустрічаються значно рідше в порівнянні з безегіриновими метасоматитами магнетит-рибекітового, рибекіт-кварц-магнетитового, залізнослюдо-рибекіт-кварц-магнетитового складу.

Метою авторів було визначення головних закономірностей зональності рибекітових метасоматитів як сировини для виробництва залізорудного концентрату. Досягненню мети сприяло вирішення наступних завдань: 1) виявлення тектонічно не порушених метасоматичних тіл для визначення закономірностей їх мінералогічної зональності; 2) опробування метасоматитів по мінералогічних зонах; 3) мінералогічне дослідження метасоматитів різних зон; 4) встановлення закономірностей зміни вмісту рудоутворювальних і другорядних мінералів у відповідності з зональністю метасоматичних тіл.

Результати досліджень та їх обговорення. Зональність є однією з фундаментальних властивостей залізисто-кремнистої формації. В розрізі саксаганської світи криворізької серії вона проявлена закономірною варіативністю петрографічних, мінералогічних, хімічних показників порід, які складають залізисті та сланцеві горизонти; на рівні стратиграфічних горизонтів – їх аутигенно-мінералогічною зональністю; на рівні верств, складених окремими мінеральними різновидами залізистих порід – ритмічним чергуванням прошарків певного складу. Ці види мінералогічної зональності є результатом прояву седиментації, діагенезу та динамотермального метаморфізму залізисто-кремнистих осадових утворень. Натрієвий метасоматоз максимальною мірою проявився в залізистих горизонтах саксаганської світи, спричинив накладення метасоматичної зональності на їх метаморфогенну зональність.

У формуванні тіл рибекітових метасоматитів провідну роль крім стратиграфічного, відігравав також тектонічний фактор. Проникнення метасоматизуючих розчинів відбу-

валось по розломах, зонах брекчіювання, кліважування, дисгармонійної складчастості залізистих кварцитів, поверхонь нашарування проверстків і верств різного мінерального складу. Навколо тектонічних порушень, що каналізували розчини, утворювались тіла натрієвих метасоматитів, для яких властива мінералогічна зональність. Для егіринвісних метасоматитів [3, 8], за умови повного прояву зональності, спостерігається така зміна метасоматичних зон у напрямку від підвідного каналу до периферії метасоматичних тіл: зона егіринізації → зона рибекітизації → зона окварцування → зона слабо і не повсемірно проявленої карбонізації → незмінені залізисті кварцити. У випадку понижених значень основних термодинамічних показників метасоматизуючих розчинів (температура, флюїдний тиск, активність натрію, фугітивність кисню) зони егіринізації не утворювались, і в центральних частинах метасоматичних тіл формувались зони рибекітизації первинних магнетитових кварцитів.

Результати польових і лабораторних мінералогічних досліджень авторів статті підтвердили дані попередників і дозволили уточнити їх для безегіринових метасоматитів. У роботах [3, 8] розглядалось утворення зональних метасоматичних тіл по залізистих кварцитах однакового первинного мінерального та хімічного складу, але для родовищ Криворізького басейну численними є прояви нестабільності цих показників. У зв'язку з цим основна увага була приділена визначенню особливостей формування мінералогічної зональності тіл рибекітових метасоматитів по неоднорідних за складом первинних залізистих породах, які характерні для приконтаткових зон залізистих горизонтів, тіл крупноглибових брекчій змішаного складу та ін. Мінералогічне картування таких метасоматичних тіл показало наступне:

1) положення тіл визначалось положенням підвідних каналів (Рис. 1, 2);

2) активність рибекітизації залізистих порід визначалась їх мінеральним складом: найбільш інтенсивних метасоматичних змін зазнавали залізнослюдо-магнетитові кварцити центральних частин залізистих горизонтів; в напрямку до периферійних зон в ряду магнетитові кварцити → кумінгтоніт-магнетитові кварцити → магнетит-кумінгтонітові кварцити активність метасоматозу зменшувалась.

На рис.1 показана зміна потужності тіла рибекітових метасоматитів з приконтаткової частини п'ятого залізистого та третього-п'ятого сланцевого горизонтів Первомайського родовища. Залізисті кварцити тут характеризуються нестабільністю мінерального складу. В напрямку від центральної до периферійної частини п'ятого залізистого горизонту спостерігається зміна верств залізнослюдо-магнетитових кварцитів верствами червоношаруватих та сірошаруватих магнетитових кварцитів, потім кумінгтоніт-магнетитових, а на контакті з третім-п'ятим сланцевим горизонтом – магнетит-кумінгтонітових кварцитів. Потужність верств залізистих кварцитів різного мінерального складу незначна в порівнянні з розмірами метасоматичного тіла. Тому можна спостерігати, як змінюється нормальна потужність метасоматичного тіла: в межах верстви залізнослюдо-магнетитових кварцитів вона становить 25-35 м; у межах верстви магнетитових кварцитів – 15-25 м; кумінгтоніт-магнетитових кварцитів – 5-15 м; магнетит-кумінгтонітових кварцитів – до 5 м. У товщі порід третього-п'ятого сланцевого горизонту метасоматичний процес згасав.

Рис. 1. Зміна потужності тіла рибекітових метасоматитів, яке утворилось по залізистих кварцитах різного мінерального складу (Первомайське родовище):

- 1-6 – первинні залізисті породи п'ятого залізного та третього-п'ятого сланцевого горизонтів:
 1 – кварцити залізнослюдко-магнетитові; 2 – кварцити магнетитові; 3 – кварцити кумінгтоніт-магнетитові;
 4 – кварцити магнетит-кумінгтонітові; 5 – сланці біотит-кварц-кумінгтонітові; 6 – сланці кварц-біотитові;
 7-9 – зони метасоматичного тіла: 7 – магнетит-рибекітових метасоматитів; 8 – рибекіт-магнетитових кварцитів;
 9 – окварцованих магнетитових кварцитів; 10 – лінії контактів верств вмісних залізистих порід і зон метасоматичного тіла;
 11 – лінія контакту залізного та сланцевого горизонтів; 12 – розривне порушення

Визначення розміру (в поперечному перетині) 26 тіл рибекітових метасоматитів з різних ділянок Первомайського родовища показало, що зазначена закономірність зберігається для більшості з них. Потужність метасоматичних тіл, утворених у верствах залізнослюдко-магнетитових кварцитів досягає 100 м (середній показник – 56 м); у верствах магнетитових кварцитів до 70 м (в середньому 47 м); кумінгтоніт-магнетитових кварцитів до 30 м (в середньому 19 м); магнетит-кумінгтонітових кварцитів до 15 м (в середньому 8 м).

Залежність інтенсивності рибекітизації, потужності та ступеню прояву метасоматичних зон від складу вихідних порід добре проявлена також у зонах крупноуламкових брекчій, які були каналами фільтрації метасоматизуючих розчинів. На рис. 2 наведено схематичне зображення тіла рибекітових метасоматитів по такій зоні. Максимальна потужність метасоматичного тіла фіксується для уламків залізнослюдко-магнетитових кварцитів, проміжна – для уламків магнетитових кварцитів, мінімальна – для кумінгтоніт-магнетитових кварцитів. Уламки сланців практично не зазнавали рибекітизації.

Вивчення особливостей внутрішньої будови досліджених метасоматичних тіл Первомайського родовища показало, що, незважаючи на різний мінеральний і хімічний склад первинних магнетитових кварцитів, зональність метасоматичних тіл аналогічна.

Вздовж тектонічних порушень, як каналів інфільтрації розчинів, формувались зони магнетит-рибекітових метасоматитів. В їх межах спостерігається практично повне заміщення рибекітом кварцу як нерудних, так і рудних прошарків вихідних магнетитових кварцитів та часткове (близько 30 об'ємн.% від первинного вмісту) заміщення магнетиту в рудних прошарках. Індивіди магнетиту зазнавали перекристалізації з укрупненням та вдосконаленням їх кристалографічних форм. Рудні прошарки первинних магнетитових кварцитів зберігались. В разі утворення натрієвих метасоматитів по кумінгтоніт-магнетитових та магнетит-кумінгтонітових кварцитах у межах цієї зони відбувалось повне заміщення кварцу, псевдоморфізація кумінгтоніту рибекітом з утворенням магнезіюрибекіту та незначне заміщення останнім магнетиту (близько 10 об'ємн.% від первинного його вмісту у вихідній породі). До другорядних мінералів цієї зони відноситься егірин, який локально присутній у вигляді окремих кристалів або радіально-променистих агрегатів. Максимальна потужність зони магнетит-рибекітових метасоматитів фіксується в розрізах метасоматичних тіл, які утворювались за рахунок первинних безсилікатних залізнослюдко-магнетитових та магнетитових кварцитів. Для 26 досліджених метасоматичних тіл цей показник коливається в межах від 1 до 30 м і зазвичай складає 5-15 м.

Рис. 2. Варіативність потужності тіла рибекітових метасоматитів, яке формувалось по різних за мінеральним складом залізистих породах крупноуламкової брекчії південної частини Ганнівського родовища:

- 1-4 – первинні залізисті породи: 1 – кварцити залізнослюдко-магнетитові; 2 – кварцити магнетитові;
 3 – кварцити кумінгтоніт-магнетитові; 4 – сланці біотит-кварц-кумінгтонітові; 5-7 – зони метасоматичного тіла:
 5 – магнетит-рибекітових метасоматитів; 6 – рибекіт-магнетитових кварцитів; 7 – окварцованих магнетитових кварцитів;
 8 – лінії контактів тіл різних за складом залізистих порід; 9 – розривне порушення

З віддаленням від підвідних каналів і, внаслідок цього, зі зменшенням активності метасоматизуючого впливу розчинів формувалась зона рибекітизованих магнетитових кварцитів. Спостерігається наступна стадійність зростання інтенсивності метасоматичного процесу. Утворення рибекіту розпочиналось з контакту рудних і нерудних прошарків, потім процес поступово захоплював рудні прошарки та частково нерудні. Від тилової зони магнетит-рибекітових метасоматитів ця зона відрізняється збереженням (різною мірою) нерудних (кварцових, залізнослюдко-кварцових, кумінгтоніт-кварцових) прошарків первинних магнетитових кварцитів. У нерудних прошарках, а при слабкому проявленні метасоматозу – і в рудних прошарках зберігались реліктові мінерали: залізна слюдка, кумінгтоніт та другорядний за поширенням біотит. При утворенні метасоматитів цієї зони за рахунок кумінгтоніт-магнетитових і магнетит-кумінгтонітових кварцитів також було характерним псевдоморфне заміщення кумінгтоніту магнезіорибекітом. Потужність зони рибекіт-магнетитових кварцитів в розрізах досліджених метасоматичних тіл досягає 50 м, а найчастіше становить 10-40 м.

В зв'язку з частковим розчиненням кварцу і винесенням кремнезему відпрацьованими метасоматизуючими розчинами за межі зон магнетит-рибекітових метасоматитів і рибекіт-магнетитових кварцитів – формувались

зони вторинного окварцування первинних магнетитових кварцитів різного мінерального складу. Спостерігається виповнення кварцом тріщин, цементування брекчій, заповнення інших порожнин у вмісних магнетитових кварцитах та незначне метасоматичне заміщення кварцом мінералів вихідних порід (магнетиту, залісної слюдки, кумінгтоніту). Потужність зон вторинного окварцування досягає 20 м, зазвичай складає 5-10 м. Зона вторинного окварцування магнетитових кварцитів характеризується поступовими переходами до незмінених їх різновидів.

На регресивній стадії натрієвого метасоматозу під впливом залишкових порцій метасоматизуючих розчинів утворювались низькотемпературні силікати (переважно, шаруваті), а також карбонати, сульфіді. Зазвичай, вони виповнюють малопотужні (до 30 мм) січні прожилки – найчастіше в проміжній та передовій зонах метасоматичних тіл. Найбільш поширеними епігенетичними мінералами є тетраферибіотит, селадоніт, залізистий тальк (мінесотаїт), кальцит, доломіт, пірит, піротин, апатит.

Кількісні співвідношення мінералів у складі рибекітових метасоматитів Первомайського родовища та вмісних магнетитових кварцитів різного складу були визначені за результатами підрахунків у 227 прозорих і 227 полірованих шліфах (Табл. 1). Наведені дані свідчать про спрощення мінерального складу метасоматитів у напрямку від передових до тлових зон.

Таблиця 1. Вміст породоутворювальних і другорядних мінералів (об'ємн.%) у складі рибекітових метасоматитів і незмінених вмісних магнетитових кварцитів Первомайського родовища

Мінерали	Зони метасоматичних тіл*			
	1	2	3	4
магнетит	22,48	24,51	28,03	29,15
кварц	3,79	37,93	56,67	53,68
гематит (залізна слюдка)	0,78	1,81	3,04	3,89
кумінгтоніт	0,06	3,61	7,22	10,97
біотит	0,00	0,11	0,16	0,19
рибекіт, магнезіюрибекіт	69,78	29,19	1,46	0,00
егірин	1,42	0,15	0,00	0,00
тетраферібіотит	0,10	0,56	0,25	0,01
селадоніт	0,06	0,23	0,44	0,03
Fe-талк (мінесотаїт)	0,00	0,12	0,33	0,02
карбонати (кальцит, доломіт)	0,83	1,10	1,47	0,95
сульфіди (пірит, піротин)	0,25	0,20	0,21	0,18
апатит	0,13	0,09	0,07	0,06
інші мінерали	0,32	0,39	0,65	0,87
Загалом	100,00	100,00	100,00	100,00
Кількість визначень	42	69	51	65

*Зони метасоматичних тіл: 1 – магнетит-рибекітових метасоматитів; 2 – рибекіт-магнетитових кварцитів; 3 – окварцованих магнетитових кварцитів; 4 – незмінні магнетитові кварцити.

Висновки.

1. Рибекітові метасоматити – найбільш поширений мінеральний різновид залізорудних натрієвих метасоматитів, до яких також відносяться егіринові та альбітові різновиди. Рибекітові метасоматити складають близько 90% від загального об'єму метасоматично змінених бідних магнетитових руд (магнетитових кварцитів) продуктивних товщ шести з дев'яти залізорудних родовищ, які розробляються чотирма з п'яти гірничозбагачувальних комбінатів Криворізького басейну. Рибекітизація значною мірою вплинула на мінералогічні показники та збагачуваність первинних метаморфогенних бідних магнетитових руд (магнетитових кварцитів).

2. Максимальну потужність тіла рибекітових метасоматитів мають за умови їх утворення у верствах безсилікатних залізнослюдко-магнетитових (до 100 м, середній показник 56 м) та магнетитових (до 70 м, в середньому 47 м) кварцитів, які складають центральні частини залізистих горизонтів саксаганської світи. За рахунок кумінгтоніт-магнетитових та магнетит-кумінгтонітових кварцитів з периферійних частин горизонтів утворювались тіла рибекітових (магнезіюрибекітових) метасоматитів значно меншої потужності, відповідно, до 30 та до 15 м (в середньому 19 і 8 м).

3. Тіла рибекітових метасоматитів, що формувались по вихідних магнетитових кварцитах різного мінерального складу, характеризуються аналогічною внутрішньою будовою. Типову зону їх складають магнетит-рибекітові метасоматити; проміжну – різною мірою рибекітизовані первинні магнетитові кварцити; передову – вторинно окварцовані магнетитові кварцити, які формувались внаслідок "відгонки" відпрацьованих метасоматизуючих розчинів, насичених кремнеземом.

4. Типова зона характеризується бімінеральним (рибекіт+магнетит) складом; у породах проміжної та передової зон суттєву роль відіграє реліктовий кварц. Вміст другорядних мінералів (егірин, тетраферібіотит, селадоніт, мінесотаїт, кальцит, доломіт та ін.) незначний і не перевищує 1,5 об'ємн.% для кожного.

5. Результати мінералогічного дослідження рибекітових метасоматитів є основою для вдосконалення методів геологічного, мінералогічного, технологічного картування рудних покладів, корегування мінералогічно-технологічних класифікацій руд, оптимізації методів усе-реднення руд перед подачею на збагачувальні фабрики.

Список використаних джерел

1. Александров И.В. Натровый метасоматоз в Криворожье / И.В. Александров // Геохимия щелочного метасоматоза. – Москва: Изд. АН СССР, 1963. – С. 71–151.
2. Евтехов В.Д. Особенности минералогического картирования месторождений в метасоматически измененных железистых кварцитах (на примере Кривбасса) / В.Д. Евтехов // Онтогенез минералов и технологическая минералогия. – Киев: Наукова думка, 1988. – С. 82–92.
3. Евтехов В.Д. Зональность натриевых метасоматитов в железистых кварцитах Северного Криворожья / В.Д. Евтехов, Г.П. Зарайский, В.Н. Балашов, О.К. Валеев // Очерки физико-химической петрологии. – Москва: Наука, 1988. – № 15. – С. 17–37.
4. Елисеев Н. А. Метасоматиты Криворожского рудного пояса / Н.А. Елисеев, А.П. Никольский, В.Г. Кушев // Труды Лаборатории геологии докембрия АН СССР. – Москва-Ленинград: Изд. АН СССР, 1961. – Вып. 13. – 204 с.
5. Кушев В.Г. Щелочные метасоматиты докембрия / В. Г. Кушев. – Ленинград: Недра, 1972. – 190 с.
6. Никольский А. П. Натриевые гидротермальные метасоматиты юго-западной части Русской платформы / А.П. Никольский // Геологический журнал. – 1973. – №2. – С. 31–44.
7. Пирогов Б.И. Технологическая минералогия железных руд / Б.И. Пирогов, Г.С. Порохов, И.В. Холошин, В.Н. Тарасенко. – Ленинград: Наука, 1988. – 302 с.
8. Пирогов Б.И. Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР. Минералогия / Б.И. Пирогов, Ю.Н. Стебновская, В.Д. Евтехов и др. – Киев: Наукова думка, 1989. – 169 с.
9. Стрельцов В.О. Генезис і типоморфні особливості рибекіту залізисто-кремнистої формації Криворізького басейну / В.О. Стрельцов // Проблеми теоретичної і прикладної мінералогії, геології, металогенії гірничодобувних регіонів. VII Міжнародна науково-практична конференція. Збірник тез доповідей. – Кривий Ріг, 2012. – С. 65–68.
10. Стрельцов В. О. Вплив рибекітизації на збагачуваність магнетитових руд Первомайського родовища Криворізького басейну / В. О. Стрельцов, А. В. Євтехова, Є. В. Євтехов // Міжнародна науково-технічна конференція. Сталій розвиток промисловості та суспільства. Збірник тез доповідей. – Кривий Ріг, 2014. – С. 12–16.

References

1. Aleksandrov I.V. (1963). Sodium metasomatism in Krivorozyhe. Geochemistry of alkali metasomatism. Moscow: Publishing house of USSR Academy of sciences, 71-151. [In Russian].
2. Evtekhov V.D. (1988). Features of mineralogical and technological mapping of deposits in metasomatically altered ferruginous quartzites (at the example of Kryvbas). Mineral ontogeny and technological mineralogy. Kiev: Naukova dumka, 82-92. [In Russian].
3. Evtekhov V.D., Zarayskiy G.P., Balashov V.N., Valeev O.K. (1988). Zoning of sodium metasomatism in ferruginous quartzites of the Northern Krivorozyhe. Physicochemical petrology essays. Moscow: Nauka, 15, 17-37. [In Russian].
4. Eliseyev N.A., Nikolskiy A.P., Kushev V.G. (1961). Metasomatites of Krivoy Rog ore belt. Proceedings of the Laboratory of Precambrian geology of USSR Academy of Sciences. Moscow-Leningrad: Publishing house of USSR Academy of sciences, 13, 204 p. [In Russian].
5. Kushev V.G. (1972). Alkaline metasomatites of the Precambrian. Leningrad: Nedra, 190 p. [In Russian].
6. Nikolskiy A.P. (1973). Sodium hydrothermal metasomatites of south-western part of the Russian platform. Geological journal, 2, 31-44. [In Russian].

7. Pirogov B.I., Porotov G.S., Holoshin I.V., Tarasenko V.N. (1988). Technological mineralogy of iron ores. Leningrad: Nauka, 302 p. [In Russian].

8. Pirogov B.I., Stebnovskaya Yu.M., Evtekhov V.D. et al. (1989). Precambrian banded iron formations of the European part of the USSR. Mineralogy. Kiev: Naukova dumka, 168 p. [In Russian].

9. Streltsov V.O. (2012). Genesis and typomorphic peculiarities of riebeckite of the banded iron formation in the Kryvyi Rih basin. Problems of theoretical and applied mineralogy, geology, metallogeny of mining regions.

VII International scientific-practical conference. Collection of abstracts. Kryvyi Rih, 65-68. [In Ukrainian].

10. Streltsov V.O., Evtekhova A.V., Evtekhov V.D. (2014). Riebeckitization influence on dressability of magnetite ore from Pervomayske deposit in the Kryvyi Rih basin. Sustainable development of industry and society. International scientific-technical conference. Collection of abstracts. Kryvyi Rih, 12-16. [In Ukrainian].

Надійшла до редколегії 07.11.16

V. Streltsov, PhD student
E-mail: mister.strelcov@bk.ru,

V. Evtekhov, Doctor of Geol. Sciences, prof.
E-mail: evtekhov@gmail.com,

A. Evtekhova, PhD. of Geol. Sciences, Assoc. Pr.
E-mail: eva_anna@mail.ru
Kryvyi Rih National University
37 Pushkina Str., Kryvyi Rih, 50002, Ukraine

SOME MINERALOGICAL ZONING FEATURES OF IRON ORE RIEBECKITE METASOMATITES IN THE KRYVYI RIH BASIN

Sodium metasomatism relates to epigenetic geological processes that had substantial impact on mineralogical indicators and washability of metamorphogenic low-grade magnetite ores (magnetite quartzites). It led to the formation of aegirine and riebeckite metasomatites, represented in productive strata of six out of nine iron ore deposits, exploited by four out of five Iron Ore Mining and Processing Works in the Kryvyi Rih basin. Riebeckite metasomatites, formed at relatively low thermodynamic factors of mineral formation medium, have much larger distribution in comparison to aegirine ones, that are 90 and 10% respectively of the total volume of metasomatic bodies.

Riebeckite metasomatites, analyzed in this paper, have the maximum thickness provided their formation took place in strata of silicateless micaceous hematite-magnetite (up to 100 m, 56 m in average) and magnetite (up to 70 m, with an average of 47 m) quartzites, which make up the central part of the ferruginous horizons of the Saksagan suite. Bodies of riebeckite (magnesian riebeckite) metasomatites of significantly lower thickness up to 30 and up to 15 m (19 m and 8 m in average) respectively were formed from cummingtonite-magnetite and magnetite-cummingtonite quartzite of peripheral zones of horizons.

Despite the mineral composition of initial magnetite quartzites, the bodies of riebeckite metasomatites are characterized by similar internal structure. The rear zone, which is adjacent to the conduits supplying metasomatizing solutions, is represented by magnetite-riebeckite metasomatites. The intermediate zone consists of varying degrees of riebeckitized primary magnetite quartzites. Front zone, which is made up of the secondary quartzous magnetite quartzites, was formed as a result of a "run-down" of waste metasomatizing solutions rich in silica. Gradual transition to the unmodified magnetite quartzites is typical for the front zone.

The main trend of mineralogical changes in magnetite quartzites due to sodium-metasomatism was approximation of their composition to practically bimimetic, that is magnetite + riebeckite (magnesian riebeckite), one. Riebeckite having composition close to the stoichiometric one, is typical for metasomatic rocks, which were formed within micaceous hematite-magnetite and magnetite quartzites. When riebeckitizing cummingtonite-magnetite and magnetite-cummingtonite quartzites mainly pseudomorphic replacement of cummingtonite by sodium amphibole occurred, the composition of the latter corresponds to magnesian riebeckite.

The results of the mineralogical studies of riebeckite metasomatites are the basis for refining methods of geological, mineralogical, technological mapping of ore deposits, for correcting mineralogical and technological classifications of ores, for optimizing methods of ore homogenization before being fed to the processing plants.

Keywords: banded-iron formation, Kryvyi Rih basin, sodium metasomatic rocks, mineralogy.

B. Стрельцов, асп.
E-mail: mister.strelcov@bk.ru,

B. Евтехов, д-р геол. наук, проф.
E-mail: evtekhov@gmail.com,

A.B. Евтехова, канд. геол. наук, доц.
E-mail: eva_anna@mail.ru
Криворожский национальный университет
ул. Пушкина, 37, г. Кривой Рог, 50002, Украина

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ РИБЕКИТОВЫХ МЕТАСОМАТИТОВ КРИВОРОЖСКОГО БАСЕЙНА

Натриевый метасоматоз относится к эпигенетическим геологическим процессам, которые имели существенное влияние на минералогические показатели и обогатимость метаморфогенных бедных магнетитовых руд (магнетитовых кварцитов). Он стал причиной образования эгиритовых и рибекитовых метасоматитов в продуктивных толщах шести из девяти железорудных месторождений, которые разрабатывают четыре из пяти горнообогатительных комбинатов Криворожского бассейна. Рибекитовые метасоматиты формировались при относительно низких термодинамических показателях среды минералообразования, поэтому имеют значительно большее распространение в сравнении с эгиритовыми, соответственно, 90 и 10% от общего объема тел метасоматически измененных руд.

Тела рибекитовых метасоматитов, которые были объектом исследования авторов, имеют максимальную мощность при условии их образования в пластах бессиликатных железнослюдко-магнетитовых (до 100 м, средний показатель – 56 м) и магнетитовых (до 70 м, в среднем 47 м) кварцитов, которые составляют центральные части железистых горизонтов саксаганской свиты. За счет куммингтонит-магнетитовых и магнетит-куммингтонитовых кварцитов периферийных зон горизонтов образовывались тела рибекитовых (магнезиорибекитовых) метасоматитов значительно меньшей мощности, соответственно, до 30 и до 15 м (в среднем 19 и 8 м).

Несмотря на минеральный состав исходных магнетитовых кварцитов, тела рибекитовых метасоматитов характеризуются аналогичным внутренним строением. Тыловая зона, которая непосредственно прилегает к подводящему каналу метасоматизирующих растворов, представлена магнетит-рибекитовыми метасоматитами. Промежуточную зону составляют в разной степени рибекитизированные первичные магнетитовые кварциты. Передовая зона, которую представляют вторично окварцованные магнетитовые кварциты, формировалась в результате "отгонки" отработанных метасоматизирующих растворов, насыщенных кремнеземом. Для передовой зоны характерны постепенные переходы к неизменным магнетитовым кварцитам.

Главным трендом минералогических изменений магнетитовых кварцитов, в связи с натриевым метасоматозом, было приближение их состава к практически биминеральному – магнетит + рибекит (магнезиорибекит). Рибекит, близкий по составу к стехиометрическому, характерен для метасоматитов, которые образовались по железнослюдко-магнетитовым и магнетитовым кварцитам. При рибекитизации куммингтонит-магнетитовых и магнетит-куммингтонитовых кварцитов происходило, преимущественно, псевдоморфное замещение куммингтонита натриевым амфиболом, состав которого отвечает магнезиорибекиту.

Результаты минералогического исследования рибекитовых метасоматитов являются основой для усовершенствования методов геологического, минералогического, технологического картирования рудных залежей, корректирования минералогических классификаций руд, оптимизации методов усреднения руд перед подачей на обогатительные фабрики.

Ключевые слова: железисто-кремнистая формация, Криворожский бассейн, натриевые метасоматиты, минералогия.